

# Rubus ambigens (Boulay) Boulay

## Boten-Brombeere

= *R. hermes* Matzk. (nom. nov. prov.), *Rubus leucandrus* subsp. *belgicus* H.E. Weber

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b></li><li>- <b>Behaarung:</b> deutlich behaart</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> keine</li><li>- <b>Stacheln:</b> oft ungleich, 7-15 pro 5 cm, gerade, geneigt oder selten mit etwas gebogener Spitze, 5-6 mm lang</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits schwach behaart, unterseits wenig, aber fühlbar behaart</li><li>- <b>Endblättchen:</b> mit herzförmiger oder ausgebuchteter Basis, eiförmig, elliptisch, ziemlich plötzlich zugespitzt</li><li>- <b>Serratur:</b> meist ziemlich regelmäßig, selten unregelmäßig gesägt</li><li>- <b>Seitenblättchen:</b> untere 0-3 mm gestielt</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mäßig behaart, mit 6-15 gebogenen oder gekrümmten Stacheln; Nebenblätter oft breit</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> kurz zylindrisch bis breit 3eckig, gerundet oder stumpf</li><li>- <b>Achse:</b> kantig, oft dicht grau und lang behaart, mit 0-2 kurzen Stieldrüsen pro 5 cm; Stacheln ungleich, gerade oder geneigt, 2-4(-5) mm lang</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> mitunter mit vereinzelt Stieldrüsen und (0-)1-10 Stacheln</li><li>- <b>Kelch:</b> locker zurückgeschlagen bis abstehend, stachellos</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß bis sehr blass rosa</li><li>- <b>Staubblätter:</b> Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *R. sciocharis* (oft 4-teilige Blätter und behaarte Staubbeutel); *R. dejonghii* (kahl, zahlreichere Drüsen im Blütenstand), *R. libertianus* (Schössling kahl, gefurcht, aufrecht)

### Ökologie und Soziologie:

**Verbreitung:** Regionalsippe im Westen (Eifel, Rheinische Bucht und Niederrhein); außerdem angrenzendes Holland, Belgien, randlich in Nordostfrankreich.