

## Rubus ambulans Matzke-Hajek Wandernde Brombeere

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> stumpfkantig mit flachen Seiten, 5-7 mm dick</li><li>- <b>Behaarung:</b> mit 10-30 einfachen, gabeligen oder gebüschelten kurzen Haaren pro cm Seite</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> sitzdrüsig, ohne Stieldrüsen</li><li>- <b>Stacheln:</b> fast gleich, 5-12 pro 5 cm, mit stark verbreitertem Fuß, mäßig bis stark geneigt und meist etwas gekrümmt oder gekniet, 4-6 mm lang</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> schwach fußförmig 5-zählig, oft etwas ledrig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits mit 5-10 Haaren pro cm<sup>2</sup>, verkahlend, unterseits kaum fühlbar kurzhaarig, aber meist von anliegenden Sternhaaren dünn graufilzig</li><li>- <b>Endblättchen:</b> mäßig lang gestielt (28-44% der Spreitenlänge), aus ausgerandetem Grund elliptisch bis eiförmig, in eine lange, kaum abgesetzte Spitze auslaufend</li><li>- <b>Serratur:</b> mit schwach aufgesetzt bespitzten Zähnen ziemlich eng und fast gleichmäßig, zuweilen mit schwach vorspringenden, geraden Hauptzähnen, 1,5 bis 2,5 mm tief</li><li>- <b>Seitenblättchen:</b> untere 4-8(-10) mm lang gestielt</li><li>- <b>Blattstiel:</b> etwa so lang wie die unteren Seitenblättchen, stieldrüsenlos, mit 12-18 stark geneigten, etwas gekrümmten (dadurch hakig wirkenden) 2,5-4 mm langen Stacheln</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> konisch</li><li>- <b>Blätter:</b> oben auf 4-8 cm blattlos, dann mit 1-2 einfachen oder gelappten, eiförmigen, unterseits hellgrau-filzigen Blättern, darunter 3-5-zählige Blätter</li><li>- <b>Achse:</b> schwach zickzackartig gebogen, mäßig dicht behaart, mit 0-2 Stieldrüsen pro 5 cm; Stacheln zu 3-8 pro 5 cm, aus verbreiteter Basis rasch verschmälert, mäßig bis stark geneigt, schwach gekrümmt oder gekniet, 3-4 mm lang</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> 12-20 mm lang, mäßig dicht wirr-kurzhaarig, nur selten mit einzelnen kurzen Stieldrüsen; Stacheln zu 4-12, gelb, schlank, etwas geneigt, fast gerade, 1-2,5 mm lang</li><li>- <b>Kelch:</b> graugrün-filzig, meist unbewehrt, nach der Blüte zurückgeschlagen</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß, selten zartrosa, eiförmig, benagelt</li><li>- <b>Staubblätter:</b> weiß, die grünlichweißen Griffel überragend; Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> an der Spitze behaart</li></ul>

**Kurzcharakteristik:** -

**Ähnliche Taxa:** *R. gremlii*, *R. macrophyllus*

**Ökologie und Soziologie:** -

**Verbreitung:** Thüringen, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Außerdem Luxemburg und Ost-Frankreich (Lothringen).