

Rubus angustipaniculatus Holub

Engrispige Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: kantig-flachseitig bis etwas rinnig - Behaarung: (fast) kahl - Stieldrüsen: keine - Stacheln: 4-10 pro 5cm, 6-7 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: 5-zählig - Behaarung: oberseits kahl, unterseits grün oder dünnfilzig - Endblättchen: lang gestielt, schmal elliptisch oder verkehrt-eiförmig, mit 6-8 mm langer Spitze - Serratur: periodisch, 2-3 mm tief - Blattstiel: mit 6-15 stark gekrümmten Stacheln
Blütenstand	- Form: recht schmal zylindrisch oder etwas pyramidal, bis zu 40 cm lang, reichblütig - Blätter: bis fast zur Spitze beblättert - Achse: ahstehend behaart, Stacheln3-6 pro 5 cm, dünn, 5-7 mm lang - Kelch: unbestachelt - Kronblätter: weiß bis hellrosa - Staubblätter: Antheren kahl - Fruchtknoten: kahl

Ähnliche Taxa: verschiedene Discolores

Ökologie und Soziologie: meist kollin; Waldsäume, lichtliebend, mäßig nemophil

Verbreitung: Hauptverbreitung in der Tschechischen Republik, Ost-Österreich, Slowenien, Kroatien,West-Ungarn und Südwest-Polen; die Art könnte auch in Ost-Sachsen und Bayern vorkommen.