

## Unterschiede zwischen *Rubus braeuckeriformis* und *Rubus braeuckeri*

	<b>braeuckeriformis</b>	<b>braeuckeri</b>
<b>Schössling</b> Stacheln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geneigt oder nur wenig gekrümmt</li> <li>- 4-6 mm lang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sichelig</li> <li>- nur 2-3(-4) mm lang</li> </ul>
<b>Blätter</b>  Endblättchen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-zählig</li> <li>- oberseits fast kahl (nur mit ca. 0-2 Haaren pro cm<sup>2</sup>)</li> <li>- Basis deutlich herzförmig</li> <li>- ± breit elliptisch bis umgekehrt eiförmig, mit meist deutlich abgesetzter, 15-20 mm langer Spitze</li> <li>- Serratur mit (aufgesetzt) lang bespitzten Zähnen</li> <li>- mit meist längeren, oft etwas auswärts gekrümmten Hauptzähnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3-5-zählig</li> <li>- mit &gt; 10 Haaren pro cm<sup>2</sup></li> <li>- Basis schmal abgerundet, seltener leicht ausgerandet</li> <li>- schmal elliptisch, lang und sehr allmählich in eine nicht abzugrenzende Spitze verschmälert</li> <li>- Serratur weniger periodisch</li> <li>- mit geraden Hauptzähnen</li> </ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oben mit 0-2 ungeteilten Blättchen</li> <li>- im unteren Teil mit meist 5-zähligen Blättern</li> <li>- Endblättchen kürzer und breiter, an der Basis ± ausgerandet</li> <li>- Kronblätter ca. 10 mm lang</li> <li>- Kronblätter nach der Blüte abfallend</li> <li>- Staubblätter die Griffel überragend</li> <li>- Antheren kahl</li> <li>- Fruchtknoten kahl oder fast kahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oben mit (2-3)3-6 ungeteilten Blättchen</li> <li>- im unteren Teil mit meist 3-zähligen Blättern</li> <li>- Endblättchen an der Basis abgerundet</li> <li>- Kronblätter ca. 6 mm lang</li> <li>- Kronblätter verwelkt bis zur Fruchtzeit ± haftend</li> <li>- Staubblätter etwas kürzer als die Griffel</li> <li>- Antheren dichthaarig</li> <li>- Fruchtknoten an der Spitze dicht behaart</li> </ul>