

## Vergleich zwischen *Rubus confusidens* und *Rubus incurvatus*

	<i>R. confusidens</i>	<i>R. incurvatus</i>
	- insgesamt sehr viel kräftiger	
<b>Schössling</b> Stacheln	- an der Basis ca. 8 mm breit und kräftig, bis 10(-12) mm lang	- viel schlanker und nur ca. 5-6 mm lang
<b>Blätter</b>	- gefingert 5-zählig - oberseits fast kahl, 0-1 Haare auf 1 cm <sup>2</sup> - unterseits grün oder etwas graugrün mit fehlenden oder wenigen Sternhaaren	- fußförmig oder 3-4-zählig - oberseits >10 Haare pro cm <sup>2</sup> - unterseits ausgeprägt graufilzig
Blattstiel	- so lang oder länger als die unteren Seitenblättchen	- kürzer als die unteren Seitenblättchen
Endblättchen	- Stielchen ca. 40-45 % der Spreitenlänge - aus breit gestutzter oder ± abgerundeter Basis breit umgekehrt eiförmig, später kreisrund bis etwas 5eckig, plötzlich in eine aufgesetzte 1-2 cm lange Spitze verschmälert	- Stielchen ca. 25-35 % der Spreitenlänge - herzeiförmig, allmählich breit zugespitzt
untere Seitenblättchen	- Serratur mit lang und fein zugespitzten, verschieden gerichteten Zähnen äußerst scharf - 4-6 mm lang gestielt	- mit viel breiteren Zähnen mäßig scharf gesägt - nur bis 2-3 mm lang gestielt
<b>Blütenstand</b>	- mit weniger, aber sehr viel kräftigeren Stacheln	- mit mehr, aber deutlich schwächeren Stacheln
Endblättchen 3-zähliger Blätter	- am Grunde abgerundet	- am Grunde herzförmig
Kronblätter	- groß, 15-20 mm lang und 10-12 mm breit	- etwa 10-12 mm lang und 6-7 mm breit