

Rubus crispomarginatus Holub Krausrandige Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none">- Form: kantig, mit rinnigen Seiten, fleckig violettrot- Behaarung: kahl- Stieldrüsen: keine- Stacheln: 3-5 pro 5 cm, breit, überwiegend etwas gekrümmt, bis etwa 8 mm lang
Blätter	<ul style="list-style-type: none">- Blättchenanzahl: handförmig 5-zählig, etwas ledrig- Behaarung: oberseits kahl, unterseits graufilzig und weichhaarig- Endblättchen: kurz gestielt, aus herzförmigem Grund meist verlängert 3-eckig und geradlinig in eine nicht abgrenzbare Spitze verschmälert- Serratur: krausrandig, stark periodisch mit breiten, rundlichen Zähnen und lappig vorspringenden Hauptzähnen, Einschnitte 3-4 mm tief- Seitenblättchen: untere deutlich länger als der Blattstiel- Blattstiel: mit 8-15 stark gekrümmten Stacheln
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none">- Form: zylindrisch bis etwas pyramidal- Blätter: 3-6 cm unter der Spitze beginnend, die unteren 3-zählig- Achse: kurz abstehend und dazu oft etwas filzig behaart, pro 5 cm mit 4-6 breiten, meist rotfüßigen, krummen, bis 3-6 mm langen Stacheln- Blütenstiele: 10-15 mm lang, dichthaarig, mit 4-10 kräftigen, gelben, etwas gekrümmten, bis 2-3 mm langen Stacheln- Kelch: unbewehrt, zurückgeschlagen- Kronblätter: weiß- Staubblätter: kahl- Fruchtknoten: behaart

Kurzcharakteristik: *R. crispomarginatus* ist charakterisiert durch einen rinnigen, kahlen Schössling mit langen Stacheln, durch handförmig 5-zählige, ledrige, oberseits kahle und unterseits graufilzige krausrandige Blätter mit kurz gestieltem, meist verlängert 3-eckigem und geradlinig in eine nicht abgrenzbare Spitze verschmälertem Endblättchen und durch einen zylindrischen Blütenstand mit weißen Kronblättern und behaarten Fruchtknoten.

Ähnliche Taxa: keine

Ökologie und Soziologie: Waldränder, auf basenreichen Böden.

Verbreitung: In Böhmen (Cvikov) rund 10 km von der deutschen Grenze entfernt, auch bei Děčín nur 10-15 km entfernt. Auf deutscher Seite sollte daher auf die Art geachtet werden. [Hauptverbreitung Tschechien, Süd-Polen, West-Slowakei, Österreich (Leithagebirge) und Ungarn].