

Rubus dejonghii A. Beek

De-Jongh-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none"> - Form: - Behaarung: (fast) kahl - Stieldrüsen: mit 0-5 Stieldrüsen pro 5 cm - Stacheln: oft ungleich, 8-20 pro 5 cm, schlank, gerade oder schwach geneigt, 4-8 mm lang
Blätter	<ul style="list-style-type: none"> - Blättchenanzahl: (3-)5-zählig - Behaarung: oberseits kahl, unterseits fast kahl oder auf den Nerven etwas behaart - Endblättchen: aus ausgebuchtetem oder selten rundem Grund eiförmig, elliptisch, fast kreisrund oder etwas 4-eckig, (ziemlich) plötzlich kurz bis mäßig lang zugespitzt - Serratur: ziemlich grob, sehr unregelmäßig, mehr doppelt als periodisch gesägt, meist mit breiten und auswärts gerichteten Zähnen - Blattstiel: mit 0-10 Stieldrüsen und 5-18 geneigten oder schwach gebogenen Stacheln
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none"> - Form: kurz zylindrisch oder pyramidal, stumpf - Blätter: - Achse: mit 0-4 Stieldrüsen pro 5 cm; Stacheln schlank, geneigt, 3-7 mm lang - Blütenstiele: mit 10->50 meistens langen Stieldrüsen und 0-10 Stacheln - Kelch: graugrün mit weißem Rand, mit kurzen Stieldrüsen, stachellos, zurückgeschlagen - Kronblätter: weiß oder blass rosa - Staubblätter: Antheren kahl oder mit vereinzelt Haaren - Fruchtknoten: mit einigen Haaren an der Spitze, mitunter kahl

Ökologie und Soziologie:

Verbreitung: Von den Niederlanden (hier ziemlich verbreitet, vor allem im Zentrum) über Belgien bis Nordfrankreich. Am Niederrhein sehr dicht an der deutschen Grenze, daher auch in Deutschland zu erwarten.