

Rubus desarmatus A. Beek

Waffenlose Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: hochbogig, kantig - Behaarung: mit 5-100 Haaren pro cm Seite - Stieldrüsen: keine - Stacheln: zu 15-30 pro Internodium, sehr schlank, geneigt, gerade bis deutlich gekrümmt, 5-7 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: handförmig (4-)5-zählig - Behaarung: oberseits mit 0-15 Haaren pro cm², unterseits fühlbar behaart, ohne Sternhaare - Endblättchen: eiförmig bis elliptisch, ziemlich plötzlich zugespitzt - Serratur: fein und scharf - Seitenblättchen: untere 1-3 mm gestielt - Blattstiel: mit 10-20 schlanken, sicheligen Stacheln
Blütenstand	- Form: zylindrisch - Achse: mit 0-7 Stacheln pro 5 cm, diese dünn, geneigt, 2-3 mm lang - Blütenstiele: mit 0-3 Stieldrüsen - Kelch: abstehend, mit langen, oft blattartigen Spitzen - Kronblätter: weiß, elliptisch - Staubblätter: Antheren kahl oder an der Spitze etwas behaart - Fruchtknoten: kahl oder an der Spitze etwas behaart

Ähnliche Taxa: *R. adpersus* (Achsen im Blütenstand mit zahlreicheren und längeren Stacheln, Fruchtknoten behaart)

Ökologie und Soziologie: Hecken und Waldränder auf nährstoffreichen Böden

Verbreitung: von SO-Niederlande (Limburg) und der Umgebung von Aachen über Belgien bis nach Nordfrankreich.