

## Rubus erinulus A. Beek

### Igel-Brombeere

#### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b></li><li>- <b>Behaarung:</b> kahl</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> keine</li><li>- <b>Stacheln:</b> (15-)25-70 pro 5 cm, dünn, geneigt und (meist) gerade, 3-6 mm lang, meist auffallend karminrot</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 3-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits mit 10-30 Haaren pro cm<sup>2</sup>, unterseits grün, dicht kurzhaarig bis fast kahl, ohne Filz</li><li>- <b>Endblättchen:</b> ziemlich kurz gestielt, aus ausgebuchtetem oder gerundetem, selten etwas keiligem Grund breit eirundlich bis fast kreisrund, mit plötzlich aufgesetzter kurzer Spitze</li><li>- <b>Serratur:</b> periodisch, mit (stark) auswärts gekrümmten Hauptzähnen</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit 14-27 dünnen Stacheln und 0-20 (Drüsen-)Borsten</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> kurz pyramidal, Gesamteindruck grün (nicht gräulich wie bei <i>R. egregius</i>)</li><li>- <b>Blätter:</b></li><li>- <b>Achse:</b> fast kahl bis schwach, nach oben zunehmend behaart, mit 0-5 kurzen Stieldrüsen und 20-35 fast nadeligen, nur 3-5 mm langen Stacheln pro 5 cm</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> mit 0-10 Stieldrüsen, dicht bestachelt</li><li>- <b>Kelch:</b> mit 0-3 Stacheln, abstehend oder schwach zurückgeschlagen</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß, kurz genagelt</li><li>- <b>Staubblätter:</b> Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *R. egregius*

**Ökologie und Soziologie:** Humusreiche Wälder auf saurem Grund

**Verbreitung:** Regionalsippe in NO-Niederlande (vor allem Drenthe und Friesland sowie umliegende Provinzen); Funde im Emsland auf deutscher Seite sind möglich