

## Rubus erubescens Wirtg. Errötende Brombeere

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Behaarung:</b> abstehend dichthaarig,</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> 5-10 (kurze) Stieldrüsen und Stachelborsten pro cm Seite</li><li>- <b>Stacheln:</b> 10-16 pro 5 cm, aus breitem Fuß rasch verschmälert, geneigt, (überwiegend) gerade, 2,5-4 mm lang</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> hand- bis schwach fußförmig 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits spärlich, unterseits fühlbar behaart</li><li>- <b>Endblättchen:</b> aus schwach herzförmiger Basis elliptisch bis (schwach) umgekehrt eiförmig, mit wenig abgesetzter, 10-18 mm langer Spitze, Rand wellig</li><li>- <b>Serratur:</b> grob, schwach periodisch mit auswärts gekrümmten Hauptzähnen, 2-3 mm tief</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> breit konisch</li><li>- <b>Achse:</b> abstehend dichtzottig behaart, dicht kurz stieldrüsig; Stacheln 7-20 pro 5 cm, zart, geneigt-gekrümmt, 2-4,5 mm lang</li><li>- <b>Kelch:</b> graufilzig, locker zurückgeschlagen</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß</li><li>- <b>Staubblätter:</b> länger als die anfangs grünlichen, später an der Basis rot werdenden Griffel; Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> an der Spitze behaart</li></ul>

**Kurzcharakteristik:** Charakteristisch für *R. erubescens* ist die dichte Behaarung aller Achsen, die fühlbare Behaarung der Blattunterseiten, die anfangs grünlichen, später an der Basis rot werdenden Griffel und die an der Spitze behaarten Fruchtknoten.

**Ähnliche Taxa:** *R. fuscus*

**Verbreitung:** Regionalart in der zentralen Eifel: Lokal häufig vom Raum Prüm nordöstlich bis in den Raum Münstereifel.