

## Rubus erubescens Wirtgen Errötende Brombeere

Ähnlich *R. fuscus*. *R. erubescens* und *R. fuscus* unterscheiden sich in folgenden Merkmalen:

	<b>erubescens</b>	<b>fuscus</b>
<b>Schössling</b>		
- Behaarung	abstehend dichthaarig	mit (20-)50-100 meist einfachen, 1mm langen Haaren
<b>Blätter</b>		
- Blättchenanzahl	hand- oder nur schwach fußförmig 5-zählig	3-4 bis (1-5 mm) fußförmig 5-zählig
- Behaarung	unterseits stets ± weichhaarig und ohne Sternhaare	unterseits kaum fühlbar bis fast weich behaart, gelegentlich filzig
- Endblättchen	grob 2-3 mm tief gesägt	2-3(-4) mm tief gesägt
<b>Blütenstand</b>		
- Blütenstandsachse	zottig behaart	sternflaumig bis dünnfilzig und dazu dicht, oft schimmernd etwa 1-1,5 mm abstehend behaart
- Kronblätter	weiß	meist (lebhaft) rosa, seltener weiß
- Staubblätter	weiß oder später rot werdend	-
- Fruchtknoten	an der Spitze behaart; Griffel anfangs grünlich, später rot werdend	(fast) kahl; Griffel meist etwas rotfüßig

**Verbreitung:** Regionalsippe in der Eifel. Hier lokal häufig vom Raum Prüm nordöstlich bis in den Raum Münstereifel.