

## Vergleich *R. geyeri* und *R. pannosus*

	<b>R. geyeri</b>	<b>R. pannosus</b>
<b>Schössling</b>	kantig	rundlich-stumpkantig
<b>Blätter</b> - Endblättchen  - Blattstiel	stärker verkahlend, glänzend schmal bis elliptisch, umgekehrt eiförmig bis schmal bis breit ei- förmig mit 10-18 etwas ungleichen, ge- krümmten bis ausgeprägt haki- gen, bis 4,5 mm langen Stacheln	mit 20-50 Haaren pro cm <sup>2</sup> breit elliptisch bis schwach umgekehrt eiförmig mit 8-13 schlanken, stark geneigten, wenig gekrümmten 2,5-3,5 mm lan- gen Stacheln
<b>Blütenstand</b>  - Blütenstiele  - Kronblätter - Fruchtknoten	- breiter, Äste länger - Blätter oft schon ca. 2 cm unter- halb der Spitze beginnend - bis 2 cm lang - mit (0-)2-8 Stieldrüsen  - Stacheln gekrümmt bis ausge- prägt hakig, bis 4,5 mm lang reinweiß dichtfilzig; Griffel grün	- ziemlich schmal pyramidal - oben auf ca. 5-10 cm blattlos  - 10-15 mm lang - mit dichten (>50), meist 0,3-0,6 mm langen Stieldrüsen - Stacheln gerade oder fast gerade, 1-2 mm lang lebhaft rosarot meist kahl; Griffel rot