

Rubus goniophorus H.E. Weber

Winkeltragende Brombeere

Exemplarische Belege (aus H.E. Weber in: Abhandl. aus dem Westf. Mus. f. Naturkunde, 47. Jg., Heft 3, 1985, S. 248f.)

Deutschland

Niedersachsen.

- Osnabrück, Klein Haltern, an der Straße nach Dübberort (3615.33), 2.9.1974, WEBER (We).

Westfalen.

- Nottuln, Feldweg bei der Schule zw. Nottuln und Havixbeck (4010.14), 1928, Dans (MSTR)
- Oelde, südl. Böckenförde (4114.44), 1928, DaHms (MSTR)
- Rand des Volmetals bei Bissing (4611.13), 2.8.1978, WEBER (We)
- Holzwickede (4411.4/ 4511.2), 10.7.1885, DEMANDT, „R. geniculatus x fragrans UTSCH” (AAU, MANCH, MSTR)
- Holzwickede, 1886, DEMANDT. B, AEnITZ Herb. eur., „R. geniculatus x fragrans UTSCH” (MSTR).

Nordrhein, Bergisches Land

- Liesenbach bei Engelskirchen, 29.9.1976, FOERSTER (Herb. FOERSTER, We).

Hessen

- Gießen, Exerzierplatz, 1924, FITSCHEN (REG)
- Marburg, Ostabhang des Goldberges bei Kölbe, 1934, Lorch (B)
- Krofdorfer Forst, südl. Waldhaus, Kreis Wetzlar, 20.9.1970, SCHNEDLER 642/70 (We).

Rheinland-Pfalz

- Westerwald, Gackebach, 15.7.1971, VANNEROM (Herb. VANNEROM).

Belgien

- Pr&s Nessonvoux, o. Dat., LEJEUNE, „R. fruticosus var. sulcatus KÖHLER”, SUDRE det. R. goniophylloides (BR).

Differentialmerkmale:

R. montanus hat allgemein schwächere Stacheln und am Grunde meist etwas herzförmige (jedenfalls nie keilförmige), breiter bespitzte Endblättchen, einen schlankeren Blütenstand mit kahlen Antheren und Fruchtknoten.

R. geniculatus besitzt ebenfalls am Grunde keilförmige, allerdings schmal elliptische Endblättchen, die nicht aufgesetzt, sondern allmählich und viel länger (15->25 mm) bespitzt sind