

# Rubus henrici-weberi Beek

## Heinrich-Weber- Brombeere

(nach H.E. Weber in: Osnabr. Naturwiss. Mitt. 33/34, 2008, S. 44-46)

*R. henrici-weberi* erinnert vor allem durch die Blattform an *R. pallidus*.  
Er unterscheidet sich davon durch die folgenden Merkmale:

<b>Merkmal</b>	<b>R. henrici-weberi</b>	<b>R. pallidus</b>
<b>Blätter</b>	handförmig 5-zählig oberseits kahl	deutlich fußförmig 5-zählig oberseits mit 5-15 Haaren pro cm <sup>2</sup>
<b>Endblättchen Form</b> <b>Basis</b> <b>Spitze</b> <b>Breite</b>	elliptisch ausgerandet sehr lang 50-65% der Länge	eiförmig bis elliptisch herzförmig bis ausgerandet 15-20 mm lang 60-75% der Länge
<b>Blütenstand</b>	pyramidal oder zylindrisch	angenähert pyramidal
<b>Blütenstandsachse</b>	dicht langhaarig	dicht abstehend und dazu sternfilzig behaart
<b>Blütenstielchen</b>	7-15 mm lang mit 5-20 Stacheln	15-30 mm lang mit 15-20 Stacheln
<b>Kronblätter</b>	schmal elliptisch	elliptisch bis etwas umgekehrt eiförmig
<b>Griffel</b>	grünlich	am Grunde rötlich