

## Rubus ignoratus H. E. Weber

### Unerkannte Brombeere

#### Bestimmungsrelevante Merkmale:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Schössling</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> niederliegend und kriechend, rundlich oder etwas kantig</li><li>- <b>Behaarung:</b> fast kahl, seltener auch dichter behaart</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> ca. 10-25 pro cm Seite, fein, ungleich</li><li>- <b>Stacheln:</b> 5-15 pro 5 cm, fast nadelig dünn, schwach geneigt, bis 3-4 mm lang</li></ul>  |
| <b>Blätter</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 3-4-fußförmig 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits dunkelgrün, mit meist 10-30 Härchen pro cm<sup>2</sup>, unterseits etwas blaugrün, mit spärlichen, nicht fühlbaren Haaren</li><li>- <b>Endblättchen:</b> lebend flach oder ± konvex, kurz gestielt (20-28 %), aus herzförmiger Basis gewöhnlich eiförmig oder elliptisch bis schwach umgekehrt eiförmig, allmählich in eine wenig schlanke, 12-20(-25) mm lange Spitze verschmälert</li><li>- <b>Serratur:</b> mit sehr breiten, rundlichen und aufgesetzt kurz bespitzten Zähnen ziemlich grob, aber dabei meist gleichmäßig oder mit etwas längeren geraden oder zum Teil etwas auswärts gekrümmten Hauptzähnen, 1-2 mm tief. Blattrand mit einzelnen kurzen Stieldrüsen</li><li>- <b>Seitenblättchen:</b> untere Blättchen 0-5 mm lang gestielt, auffallend kleiner als die übrigen Blättchen</li><li>- <b>Blattstiel:</b> oberseits fast kahl, mit dichten Stieldrüsen(-Borsten); Stacheln etwa zu 6-13, nadelig, etwas geneigt, gerade oder wenig gekrümmt, bis 1,5-2 mm lang</li></ul> |
| <b>Blütenstand</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> wenig umfangreich</li><li>- <b>Blätter:</b> bis zur Spitze oder nahe darunter beblättert</li><li>- <b>Achse:</b> meist etwas knickig gebogen, (fast) kahl oder zerstreut, seltener auch dichter behaart, mit zahlreichen ungleichen Drüsenborsten und zerstreuten bis zahlreicheren, nadeligen, etwas geneigten, geraden oder wenig gekrümmten, bis 2-3 mm langen Stacheln</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> 10-30 mm lang, grünlich, mit angedrückten Sternhärchen und dichten, ungleichen, bis 1,5 mm langen gelblichen oder rötlichen Drüsenborsten; Stacheln zu etwa 3-10, nadelig, gerade abstehend, bis 1,5-2 mm lang</li><li>- <b>Kelch:</b> grünlich, mit (Drüsen-)Borsten und Stachelchen, die dünnen, oft etwas verlängerten Zipfel die Sammelfrucht umfassend</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß, sehr schmal elliptisch</li><li>- <b>Staubblätter:</b> etwas kürzer oder länger als die grünlichen Griffel; Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl, Fruchtboden fast kahl</li></ul>  |

**Kurzcharakteristik:** Die Art ist vor allem charakterisiert durch ihre oft (fast) kahlen, mit langen Drüsenborsten und nadeligen Stacheln besetzten Achsen, durch die gewöhnlich herzeiförmigen, grob und entfernt kerbzahnigen Endblättchen, die kleinen unteren Seitenblättchen sowie durch die schmalen Kronblätter.

**Ähnliche Taxa:** *R. ignoratiformis*; *R. oreades* (unterscheidet sich leicht durch periodisch gesägte Blätter mit stark auswärts gekrümmten Hauptzähnen)

**Ökologie und Soziologie:** Ausgeprägt nemophile Sippe vorzugsweise der submontanen bis montanen Stufe, auf mäßig nährstoffreichen, meist kalkfreien Böden.

**Verbreitung:** . Wenig bekannt. Bei engerer Fassung der Art vielleicht nur Regionalsippe. Nachgewiesen vom Sauerland bis in die Eifel, bis Belgien und in die Niederlande.