

## Rubus insectifolius P.J. Müll. & Lefèvre Tiefzählige Brombeere

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Behaarung:</b> dicht behaart</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> 40-50 pro 5 cm</li><li>- <b>Stacheln:</b> größere 10-20 pro 5 cm, breit, geneigt oder etwas gebogen, bis 3-6 mm lang; außerdem 2-10 kleine Stachelchen pro 5 cm</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits behaart, unterseits schwach behaart bis fast kahl</li><li>- <b>Endblättchen:</b> kurz gestielt, aus abgerundetem Grund elliptisch, allmählich (sehr) lang zugespitzt</li><li>- <b>Serratur:</b> periodisch, ziemlich grob, mit scharfen, geraden Hauptzähnen</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit relativ wenigen Stieldrüsen; Stacheln zu 10-15, gebogen</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> lang und schmal pyramidal</li><li>- <b>Blätter:</b> in der Spitze beginnend</li><li>- <b>Achse:</b> mit 3-10 kurzen Stieldrüsen und 2-10 kleinen Stachelchen pro 5 cm; größere Stacheln zu 3-10 pro 5 cm, mit breiter Basis, stark gekrümmt, 3-4 mm lang</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> mit 50-150 Stieldrüsen und 4-8 Stacheln</li><li>- <b>Kelch:</b> (fast) unbestachelt, mit 5-20 Stieldrüsen, anfangs locker zurückgeschlagen, später abstehend oder aufgerichtet; an der Innenseite gewöhnlich mit roter Basis</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß oder sehr blass rosa, klein (<math>\pm</math> 9 mm lang)</li><li>- <b>Staubblätter:</b> Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl, Griffel gelb oder rötlich</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *R. loehrii*, zu dem diese Art früher oft gezählt wurde

**Ökologie und Soziologie:** ältere Wälder auf nährstoffreichen Böden

**Verbreitung:** Hauptverbreitung N-Frankreich über S-Belgien bis S-Niederlande; an der Maas sehr dicht an der deutschen Grenze und daher möglicherweise auch am Niederrhein zu finden.