

## Rubus kletensis M. Lepší & P. Lepší

### Klet-Haselblattbrombeere

#### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> kantig mit etwas gewölbten Seiten, an sonnigen Wuchsorten violett gefärbt, sonst grün, oft grau bereift</li><li>- <b>Behaarung:</b> pro 5 cm mit 0-2 einfachen Haaren</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> mit 0-45 sitzenden oder kurz gestielten Drüsen pro 5 cm</li><li>- <b>Stacheln:</b> 3-20 pro 5 cm, nur (1,2-)1,5-3,0(-3,5) mm lang, gekrümmt bis hakig, breit an der Basis, jedoch mit schmaler Spitze</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits mit 0-42 Haaren pro cm<sup>2</sup>, unterseits fühlbar behaart, Blattnerven tragen kammförmig angeordnete Haare; filzlos</li><li>- <b>Endblättchen:</b> mäßig kurz gestielt, aus herzförmigem Grund breit (umgekehrt) eiförmig bis rundlich, mit abgesetzter, 17-27 mm langer Spitze</li><li>- <b>Serratur:</b> scharf, grob, doppelt gesägt, 3,5-7 mm tief</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit 11-30 (hakig) gekrümmten Stacheln</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> armlütig, gedrängt</li><li>- <b>Blätter:</b> schmal verkehrt eiförmig</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> 0,4-1 mm lang abstehend behaart, mit roten sitzenden und gestielten Drüsen</li><li>- <b>Kelch:</b></li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß</li><li>- <b>Staubblätter:</b> Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *R. hadracanthos* (Schössling mit größeren, geraden bis leicht gekrümmten Stacheln und rosa Kronblättern); *R. josefianus* (größere und viel mehr Stacheln und die Unterseite der Blätter fühlt sich nicht behaart an)

**Ökologie und Soziologie:** thamnophil, Gebüschsäume, Hohlwege, Straßenböschungen, Ruderalstellen

**Verbreitung:** Einzelfunde in SO-Bayern (Rotthalmünster, Riedertsham im Lkr. Passau); Hauptverbreitung Böhmen und Oberösterreich.