

Rubus lictorum Plieninger

Liktoren-Haselblattbrombeere

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus lictorum* und *Rubus fasciculatus*

(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 20)

Merkmale	<i>R. lictorum</i>	<i>R. fasciculatus</i>
Bestachelung	Stacheln basal wenig verbreitert, ± rechtwinklig abstehend	Stacheln mit leistenförmig verbreiteter Basis, meist geneigt
Blatthaltung	flach	konvex
Blattfarbe oberseits	lebhaft hellgrün	matt (dunkel) graugrün
Behaarung der Blattunterseite	deutlich fühlbar, vor allem auf den Blattnerven dicht und abstehend	wenig fühlbar, gleichmäßig über die Fläche verteilt
Behaarung der Blattoberseite	mäßig und ungleich dicht, in der Mitte der Interkostalfelder konzentriert; meist < 50 fast gleichlange Haare pro cm ²	gleichmäßig dicht, bis > 200 ungleich lange Haare pro cm ²
Mittlere Seitenblättchen	kurz, höchstens bis 5 mm lang gestielt, basal asymmetrisch „ulmenartig schief“	meist deutlich > 5 mm lang gestielt, basal ohne Unterschiede zwischen den Hälften
Blütenstand	armblütig, Seitenäste fast durchweg 1-2-blütig	reichblütig, Seitenäste meist > 3-blütig