

## Rubus paraplicatus K.Meijer

### Falsche Falten-Brombeere

#### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> Wuchs ± suberekt</li><li>- <b>Behaarung:</b> kahl</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> keine</li><li>- <b>Stacheln:</b> 0-6(-15) pro 5 cm, geneigt oder etwas gekrümmt, 4-6 mm lang</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits mit einzelnen Haaren, unterseits nur auf den Nerven behaart</li><li>- <b>Endblättchen:</b> flach, aus ± herzförmigem Grund eiförmig, sehr allmählich in die Spitze verschmälert</li><li>- <b>Serratur:</b> scharf, mit rechteckigen Zähnen, nicht bis deutlich kurz periodisch</li><li>- <b>Seitenblättchen:</b> untere 0-3 mm gestielt</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit 2-7(-14) etwas gekrümmten Stacheln</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> (fast) traubig</li><li>- <b>Blätter:</b> obere unterseits auf den Nerven etwas weichhaarig</li><li>- <b>Achse:</b> wenig behaart, mit 0-2 geneigten oder schwach gekrümmten, 2-3(-4) mm langen Stacheln pro 5 cm</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> ± anliegend behaart, mit 0-1(-3) Stacheln</li><li>- <b>Kelch:</b> grünlich, abstehend oder locker zurückgeschlagen</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß bis schwach rosa</li><li>- <b>Staubblätter:</b> länger als die grünlichen Griffel; Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> etwas behaart</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *R. plicatus*, *R. opacus*, *R. bertramii*

**Verbreitung:** Hauptverbreitung in den Niederlanden (Friesland, Drenthe, südlich bis Brabant); in Deutschland östlich bis Hannover, vermutlich hier bisher als "*R. plicatus* s. lat." verkannt