

## Rubus perpedatus Žila & H.E. Weber Breitfüßige Brombeere

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Behaarung:</b> zerstreut behaart</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> zerstreut</li><li>- <b>Stacheln:</b> zu 8-18 pro 5 cm, ungleich, geneigt, gerade bis etwas gekrümmt, schlank, 5-6 mm lang</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> (3-) ausgeprägt (-12 mm) fußförmig 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits fast kahl, unterseits graugrün bis grauweiß und deutlich fühlbar behaart</li><li>- <b>Endblättchen:</b> lang gestielt, aus leicht herzförmiger (selten abgerundeter) Basis (verkehrt) eiförmig, plötzlich in eine 15-25 mm lange Spitze verzüngt</li><li>- <b>Serratur:</b> scharf, periodisch mit oft schwach auswärts gekrümmten Hauptzähnen, 2-4 mm tief</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit zahlreichen gekrümmten Stacheln</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> schmal</li><li>- <b>Achse:</b> mit 6 - 6,5 mm langen Stacheln</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> 20-25 mm lang; Stieldrüsen zahlreich, überragt von langen Haaren</li><li>- <b>Kronblätter:</b> blassrosa</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> behaart</li></ul>

**Ähnliche Taxa:** *Rubus radula* (längere Schösslingsstacheln, kürzere Blütenstiele)

**Ökologie und Soziologie:** eher thamnophil; Waldwege, Waldränder, Gebüsche; hauptsächlich auf basenreichen Böden; hochkollin - submontan

**Verbreitung:** Regionalart im Westen der Tschechischen Republik (Böhmerwald), in Deutschland bisher nur sehr lokal und randlich in Ost-Bayern (Hinterer Oberpfälzer Wald, Chamfurter Senke, Bayerischer Wald, Falkensteiner Vorwald). Ein Einzelfund in Oberösterreich (Walding).

(siehe auch Žila und Weber in Preslia, Praha, 77: S. 433–437, 2005)