

## Rubus poliothyrus A. Beek

### Graurispige Brombeere

#### Bestimmungsrelevante Merkmale:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Schössling</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b></li><li>- <b>Behaarung:</b> mit &gt; 20 Haaren pro cm</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> keine</li><li>- <b>Stacheln:</b> zu 5-12 pro 5 cm, geneigt oder gekrümmt bis sichelförmig, 4-8 mm lang</li></ul>   |
| <b>Blätter</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseits kahl oder schwach behaart, unterseits graugrün bis grauweiß filzig</li><li>- <b>Endblättchen:</b> schmal eiförmig bis rhombisch oder umgekehrt eirundlich, mit kaum bis deutlich abgesetzter Spitze</li><li>- <b>Serratur:</b> flach, aber deutlich periodisch, mit scharfen Zähnen</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit 7-15 gekrümmten Stacheln</li></ul>  |
| <b>Blütenstand</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> verlängert schmal zylindrisch, mit schmaler Spitze</li><li>- <b>Blätter:</b> oben blattlos</li><li>- <b>Achse:</b> mit 0-2 geneigten bis gekrümmten, 1-3 mm langen Stacheln pro 5 cm</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> mit 0-3 abstehenden Stacheln</li><li>- <b>Kelch:</b> abstehend</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß</li><li>- <b>Staubblätter:</b> Staubblätter kaum länger als die gelblich-grünen Stacheln; Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> dicht behaart</li></ul> |

**Ökologie und Soziologie:** Wiesen- und Wegränder (an offeneren Stellen als *R. chloocladus*)

**Verbreitung:** Nur Einzelfunde in Nordrhein-Westfalen bei Anholt, aber sicherlich auch z. B. rund um Bad Bentheim; [Hauptverbreitung O-Niederlande (O-Gelderland), disjunkt in SW-Niederlande (Brabant), NO-Frankreich und N-Belgien]