

# Rubus psilops A. Beek & Meijer

## Grobzähnige Brombeere

**Bestimmungsrelevante Merkmale:**

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> Schössling bogig, kantig-flachseitig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> mit 0-10 Haaren pro cm Seite</li> <li>- <b>Stieldrüsen:</b> mitunter mit vereinzelt Stieldrüsen</li> <li>- <b>Stacheln:</b> zu (5-)10-18 pro 5 cm, schmal, gerade bis etwas gebogen, 2-6(-7) mm lang</li> </ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 5-zählig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> oberseits kahl oder zerstreut behaart, unterseits grün</li> <li>- <b>Endblättchen:</b> meist etwa rhombisch, mitunter eiförmig oder verkehrt eiförmig, oft etwas konvex</li> <li>- <b>Serratur:</b> grob, ungleichförmig, periodisch, mitunter mit stark auswärts gekrümmten Hauptzähnen</li> <li>- <b>Blattstiel:</b> meist kürzer als die unteren Blättchen, mit (2-)5-20 geneigten oder etwas gekrümmten Stacheln</li> </ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> schmal pyramidal oder zylindrisch</li> <li>- <b>Blätter:</b> fast blattlos</li> <li>- <b>Achse:</b> ziemlich dicht kurzhaarig, mit zahlreichen fast sitzenden Stieldrüsen; Stacheln (5-)6-8(-9) pro 5 cm, 2-4 mm lang</li> <li>- <b>Blütenstiele:</b> dicht kurzhaarig mit 100-&gt;200 fast sitzenden oder ungleich gestielten Drüsen und 4-10 geraden Stacheln</li> <li>- <b>Kelch:</b> mit zahlreichen fast sitzenden Drüsen und 0-2 Stacheln, zurückgeschlagen</li> <li>- <b>Kronblätter:</b> weiß</li> <li>- <b>Staubblätter:</b> die gelblichen Griffel überragend, Antheren kahl</li> <li>- <b>Fruchtknoten:</b> kahl</li> </ul>

**Ökologie und Soziologie:** Waldsäume, ältere Wälder

**Verbreitung:** ein Einzelfund in Niedersachsen (Dinklage), sicherlich im Nordwesten weiter verbreitet; Hauptverbreitung NO-Niederlande (Drenthe, Overijssel)