

Rubus schlickumii Wirtgen Schlickums Brombeere

Differentialmerkmale: (nach G. Matzke-Hajek in: Mainzer naturw. Archiv, 33, Mainz 1995, S. 112)

	R. schlickumii	R. praestans
Schössling	<ul style="list-style-type: none"> - meist >10 Stieldrüsen pro 5 cm - <15 Haare pro cm Seite - Stacheln dichter und breiter, weniger geneigt, aber nur max. 6 mm lang 	<ul style="list-style-type: none"> - <5 Stieldrüsen pro 5 cm, oft ganz ohne - 15-30 Haare pro cm Seite - Stacheln bis 7,5 mm lang
Blatt	<ul style="list-style-type: none"> - Blattspitze stärker abgesetzt, aber kürzer - die Hauptzähne weniger stark vorspringend, Serratur dadurch gleichmäßiger, nur 2 mm tief 	<ul style="list-style-type: none"> - Blattspitze weniger abgesetzt, aber länger - die Hauptzähne stärker vorspringend, Serratur dadurch ungleichmäßiger, bis 4 mm tief
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none"> - kompakter, Seitenästchen aufrecht - 3-zählige Blätter mit 1-3 mm lang gestielten Seitenblättchen - Blütenstiele abstehend dichthaarig, die Stieldrüsen von Haaren eingehüllt - Fruchtknoten mit einigen langen Haaren besetzt 	<ul style="list-style-type: none"> - locker, Seitenästchen rechtwinklig abstehend - 3-zählige Blätter mit bis 8 mm lang gestielten Seitenblättchen - Blütenstiele überwiegend angedrückt behaart, die wenigen Stieldrüsen dadurch exponiert - Fruchtknoten völlig kahl
	niedrigere Gestrüppe	klettert meist hoch in Gebüsche und ist seltener als freistehender Strauch zu finden