

Rubus slavonicus Király, Trávn. & Zíla Slavonische Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none">- Form: kantig, flachseitig- Behaarung: mit 10-30 Haaren pro cm Seite- Stieldrüsen: sehr zerstreut oder fehlend- Stacheln: 7-15 pro 5 cm, deutlich gebogen, 3-7 mm lang
Blätter	<ul style="list-style-type: none">- Blättchenanzahl: handförmig 5zählig- Behaarung: oberseits meist dunkelgrün, mit bis zu 50 Haaren pro cm², später verkahlend, unterseits graugrün filzig- Endblättchen: eiförmig mit 20-30 mm langer Spitze- Serratur: regelmäßig oder periodisch- Blattstiel: mit zerstreuten Stieldrüsen und 10-22 gebogenen Stacheln
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none">- Form: kegelförmig, pyramidenförmig oder zylindrisch- Blätter: oben 5-10 cm blattlos- Achse: mit 5-100 Stieldrüsen pro cm Länge und pro 5 cm mit 3-8 stark gebogenen, 3-5 mm langen Stacheln- Blütenstiele: behaart und mit 2-50 Stieldrüsen, Stacheln zu 7-15, ± gerade- Kelch: filzig, mit wenigen Stieldrüsen und wenigen Stacheln, abstehend bis zurückgeschlagen- Kronblätter: weiß- Staubblätter: länger als die hellgrünen Griffel; Antheren kahl- Fruchtknoten: spärlich behaart

Verbreitung: Bisher nur verschleppt an der Autobahn in SO-Bayern (Chiemsee); Hauptverbreitung Südosteuropa.