

Rubus taxandriae Vannerom ex A. Beek **Schwelende Brombeere**

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none">- Behaarung: dicht behaart- Stieldrüsen: 0-5 pro cm- Stacheln: 10-20 pro 5 cm, (oft stark) geneigt, gebogen oder gekniet, 5-8 mm lang, daneben einige kleinere Stachelchen
Blätter	<ul style="list-style-type: none">- Blättchenanzahl: 3-5-zählig- Behaarung: oberseits kahl oder wenig behaart, unterseits mäßig bis dicht kurz behaart- Endblättchen: aus ausgebuchtetem Grund eiförmig bis elliptisch, mitunter etwas umgekehrt eiförmig oder fast kreisrund, kurz zugespitzt- Serratur: ziemlich regelmäßig, mit ziemlich breiten Zähnen- Blattstiel: mit 10->200 Stieldrüsen, Stacheln zu 8-12, stark geneigt, sichelig bis hakig
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none">- Form: ± pyramidal- Achse: mit 0-4 Stieldrüsen pro 5 cm; größere Stacheln zu 4-18 pro 5 cm, stark geneigt, gekrümmt, hakig oder oft gekniet, bis 4-7 mm lang- Blütenstiele: mit 4->50 langen Stieldrüsen und (4-)7-15 Stacheln- Kelch: locker zurückgeschlagen oder abstehend, später manchmal zum Teil aufgerichtet- Kronblätter: weiß oder blass rosa- Staubblätter: Antheren kahl- Fruchtknoten: behaart; Griffel an der Basis oder ganz (purpern-)rot

Verbreitung: Regionalsippe mit Hauptverbreitung in S-Niederlande, dort recht verbreitet; am Niederrhein sehr dicht an der Grenze und daher auf deutscher Seite am Niederrhein bei Kleve (etc.) zu erwarten.