

## Rubus teretiusculus Kaltenb. Jochmännige Brombeere

### Bestimmungsrelevante Merkmale:

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> rundlich</li><li>- <b>Behaarung:</b> ziemlich dicht behaart</li><li>- <b>Stieldrüsen:</b> 0-25 pro 5 cm</li><li>- <b>Stacheln:</b> große 15-20 pro Internodium, schwach bis mäßig gekrümmt, 5-7 mm lang; Stachelchen 2-10 pro 5 cm</li></ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 3-5-zählig</li><li>- <b>Behaarung:</b> oberseitig leicht behaart, unterseits dichter behaart, grün</li><li>- <b>Endblättchen:</b> aus abgerundetem Grund verkehrt eiförmig, abrupt zugespitzt</li><li>- <b>Serratur:</b> mit ziemlich gleichmäßig stumpfen, ± geraden Zähnen</li><li>- <b>Seitenblättchen:</b> etwas länger bis kürzer als der Blattstiel</li><li>- <b>Blattstiel:</b> mit ca. 10 gekrümmten Stacheln</li></ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Form:</b> schmal pyramidal</li><li>- <b>Blätter:</b> ziemlich hoch beblättert</li><li>- <b>Achse:</b> locker behaart, mäßig stieldrüsig, Stacheln zu 5-15 pro Internodium, schlank, 3-6 mm lang</li><li>- <b>Blütenstiele:</b> 9-25 mm lang, mit 5-20 Stacheln und 8-60 kurzen Stieldrüsen</li><li>- <b>Kelch:</b> graufilzig, mit 0-10 Drüsen und 1-7 Stacheln, mit verlängerten Spitzen; locker zurückgeschlagen</li><li>- <b>Kronblätter:</b> weiß</li><li>- <b>Staubblätter:</b> länger als die an der Basis rötlichen Griffel; Antheren kahl</li><li>- <b>Fruchtknoten:</b> (fast) kahl</li></ul>

**Ökologie und Soziologie:** Waldränder, auf nährstoffreichen, neutralen bis kalkhaltigen Böden

**Verbreitung:** Regionalsippe, bisher nur rund um Aachen; Hauptverbreitung O-Belgien, ein Einzelfund auf benachbarter niederländischer Seite in S-Limburg